

Zusammenfassung



häufige Arzneimittelinteraktion

Phytopharmakon

Ginkgo

Ginkgo

Ginseng

Ginseng

Johanniskraut

Johanniskraut

Johanniskraut

Johanniskraut

Arznei

Antikoagulantien

Thiaziddiuretika

Coumarine

Ethanol

Antidepressiva) SRI's

Theophyllin

Digoxin

Cyclosporin

Wechselwirkung

Spontanblutungen

Hypertonie

Wirkungsverlust

gesteigerter Abbau

Serotoninsyndrom

Wirkungsverlust

Wirkungsverlust

Wirkungsverlust

häufige Arzneimittelinteraktion

ABC: ASK BEFORE CUT

- **Fragen Sie Ihren Patienten explizit nach Phytopharmaka, besonders bei geplanter Regionalanästhesie!**
- **bei unklaren Symptomen an WW mit Phytotherapie denken**
- **Achten Sie auf Notfallsituationen, wenn Phytopharmaka beteiligt sind (Blutungen, Krampfanfälle, Manie, Koma)!**
- **Tritt der erwünschte Effekt nicht auf, denken Sie an Interaktionen (Diuretika, Phenytoin)**

häufige Arzneimittelinteraktion

ABC: ASK BEFORE CUT

- Natürlich bedeutet nicht harmlos!
- Phytopharmaka sind keine “Allheilmittel”
- Phytopharmaka unterliegen keiner Arzneimittelprüfung
- Zusammensetzung nicht standardisiert
- direkte Toxizität (karzinogen, teratogen)
- Laborkontrollen, im Zweifel Anästhesie verschieben (14 Tage)

häufige Arzneimittelinteraktion

ABC: ASK BEFORE CUT

Anästhesie:

- **kardiovaskuläre Instabilität**
- **verlängerte Anästhesiedauer**
- **unerwartete Blutungsneigung**
- **embolische Komplikationen**
- **massive sympathomimetische Effekte**
- **cave: Elektrolytverschiebungen**